

Εκχύλισμα  
Ψαριών 25%

Οργανοχημικό  
Λίπασμα  
Νέου Τύπου



**VITAMIN SEA NK**

**8-0-8**

10L



Ομάδα λιπασμάτων (γ) Υ.Α 257921/2004  
Αριθμός Κυκλοφορίας 223

# VITAMIN SEA NK 8-0-8

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Το Vitamin Sea NK είναι ένα καινοτόμο οργανοανόργανο υγρό λίπασμα το οποίο έχει ενα φυσική πηγή πρώτων υλών τα Θαλασσιάνα ψάρια και βότανα. Το προϊόν παράγεται με την καινοτομία της Ikorganic και είναι 100% αφομοιώσιμο από τα φυτά. Η πολυεπίπεδη δράση του απορρέει από την συγκέντρωση βιολογικά ενεργών ενώσεων όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, φυσικές ορμόνες, βιταμίνες συμπλεγματος Β και την παρουσία οργανικής ουσίας, μακροστοιχείων και μικροστοιχείων. Δρα γρήγορα και αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών των καλλιεργειών εστιάζοντας στις απαιτήσεις τους σε άζωτο (N) και κάλιο (K) κατά απόλυτα ισορροπημένο τρόπο. Η εξειδικευμένη σύνθεση του αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους βελτιώνοντας την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά. Η χρήση του ως συμπλήρωμα θρέψης στα κρίσιμα στάδια του βιολογικού κύκλου του φυτού (βλαστική ανάπτυξη, άνθιση, καρπόδεση, ανάπτυξη καρπών) εξασφαλίζει την βελτίωση της απόδοσης της καλλιέργειας και την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής.

**ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Με το σύστημα άρδευσης (υδρολίπανση) και διαφυλλικά.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, καρπούζι, πεπόνι: 0.8-1 λιτ./στρ., η εφαρμογή γίνεται μέσω της άρδευσης (υδρολίπανση) ή διαφυλλικά με 150-200cc στα 100 λίτρα νερού από το δέσιμο των καρπών έως το τέλος της ανάπτυξης και πριν τον χρωματισμό. Οι επαναλήψεις γίνονται ανά 10-15 ημέρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας. **Μαρούλι, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι:** 1<sup>η</sup> εφαρμογή 15-20 ημέρες μετά την μεταφύτευση και επανάληψη κάθε 15 ημέρες μέχρι την πλήρη ανάπτυξη σύμφωνα με τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας. **Υδρολίπανση** με 0.8-1 λιτ./στρ. ή διαφυλλικά 150-200cc στα 100 λίτρα νερού. Προτείνεται η τελευταία εφαρμογή να απέχει 10 ημέρες από την συγκομιδή. **Κονδυλώδη (πατάτα), βολβώδη (κρεμμυδι), ριζώδη (καρότο):** 0.8-1.2 λιτ./στρ., η εφαρμογή γίνεται μέσω της άρδευσης (υδρολίπανση) ή διαφυλλικά με 200-300cc στα 100 λίτρα νερού από τα πρώτα στάδια σχηματισμού του βολβού μέχρι την πλήρη ανάπτυξη. Οι επαναλήψεις γίνονται ανά 10-15 ημέρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας. **Κρίσιμα στάδια στην καλλιέργεια της πατάτας** είναι η έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και η διόγκωση τους. Η ισορροπη λίπανση NK εξασφαλίζει ποιοτικούς κονδύλους με υψηλή περιεκτικότητα σε άμλο και καλή διατηρησιμότητα. **Φρούλα:** 0.8-1 λιτ./στρ., η εφαρμογή γίνεται μέσω της άρδευσης (υδρολίπανση) ή διαφυλλικά με 150-200cc στα 100 λίτρα νερού από την βλαστική ανάπτυξη μέχρι πριν την ανθοφορία. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται ανά 10-15 ημέρες ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας. **Αμπέλι:** 1-1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 200cc στα 100 λίτρα νερού, στα πρώτα στάδια βλαστικής ανάπτυξης και από την καρπόδεση μέχρι τον χρωματισμό.

**Χειμερινά δημητριακά (σιτάρι κ.α.):** Διαφυλλικά έως 300cc στα 100 λίτρα νερού, για κάλυψη θρεπτικών αναγκών σε ΝΚ, εφαρμογή κατά την ζιζανιοκτονία, αρχές Μαρτίου (καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων) – τέλη Μαρτίου (καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων).

**Δενδρώδεις καλλιέργειες:** Προτείνονται 2-3 εφαρμογές ανά 20-30 ημερών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας. **Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά):** 1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 200cc στα 100 λίτρα νερού από την πτώση των πετάλων - το δέσιμο των καρπών μέχρι πριν τον χρωματισμό. **Γυαργόκαρπα (αχλαδιά, μηλιά):** 1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 200cc στα 100 λίτρα νερού από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι πριν τον χρωματισμό των καρπών. **Εσπεριδοειδή:** 1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 200cc στα 100 λίτρα νερού μετά την ανθοφορία μέχρι την συγκομιδή. **Ελιά:** 1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 200cc στα 100 λίτρα νερού από την έναρξη του νέου βλαστικού κύκλου μέχρι πριν την ανθοφορία. **Ακτινίδιο:** 1-1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 200cc στα 100 λίτρα νερού, από την έναρξη του νέου βλαστικού κύκλου μέχρι πριν την ανθοφορία. **Ακρόδρυα (αμυγδαλιά):** 1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 200cc στα 100 λίτρα νερού, κατά την ανάπτυξη του καρπού και του γειμάσματος της ψίκας. **Ψυχανθή (φασόλι κ.α.):** 1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 250cc στα 100 λίτρα νερού, έναρξη των εφαρμογών από το στάδιο σχηματισμού των λοβών, την ανάπτυξη τους και το γέμισμα των σπερμάτων. **Τριφύλλι, μηδική:** 1.5 λιτ./στρ. με υδρολίπανση ή διαφυλλικά έως 250cc στα 100 λίτρα νερού, μετά από κάθε κοπή.

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ολικό Άζωτο (N) 8% • Νιτρικό Άζωτο (N-NO<sub>3</sub>) 2.3% • Αμμωνιακό Άζωτο (N-NO<sub>2</sub>) 1.5% • Ουρικό Άζωτο (N-NO<sub>2</sub>) 4.2% • Κάλιο (K<sub>2</sub>O) 7.3% • Ολικό Ασβέστιο Ca EDTA 0.5% • Ολικό Μαγνήσιο MgO 0.4% • Οργανικός Άνθρακας 2.4% • Οργανική Ουσία επί Ύδρου 17.3% • pH 9.3 • EC 3.2 mS/cm • Συνολικό ΑμινοΞέα 1413 mg/100g

**ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.150g/L. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Συνδυάζεται με τα περισσότερα λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Πριν την χρήση συσταται η εφαρμογή σε μικρές επιφάνειες, ώστε να ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα προϊόντα. **Παρασκευαστής και διανομέας:** Ikorganic, Ελαιών 36, 14564 Ν.Κηφισιά, Τηλ: 210 8000551, info@ikorganic.com, www.ikorganic.com. Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777. Προϊόν σταθερής σύνθεσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, οφθαλμών, δεν εισπνέεται, δεν καταπίνεται. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ & ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν δεν υποχωρεί ο ερεθισμός συμβουλευτείτε ή επισκεφθείτε γιατρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί. Πλύνετε τα χέρια σας αοχλαστικά μετά το χειρισμό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο & στεγασμένο χώρο.

