



All Star Fe

6.36 Fe + 27.6% Οργ. Ουσία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το All Star Fe είναι ένα καινοτόμο, οργανικό, υγρό λίπασμα Σιδήρου με βιοδιαγεφυρτική δράση. Προέρχεται από την αξιοποίηση των υπολειμμάτων του υποστρώματος καλλιέργειας των μανιταριών *Agaricus bisporus* και *Pleurotus ostreatus* και του φύκου *Ascophyllum nodosum*. Προλαμβάνει και αντιμετωπίζει την έλλειψη Σιδήρου στις καλλιέργειες. Ο Σίδηρος είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την αναπνοή και την φωτοσύνθεση στα φυτά. Εμπλέκεται στην ενεργοποίηση οξειδωτικών ενζύμων καθώς και στην βιοσύνθεση της χλωροφύλλης, της χρωστικής που είναι υπεύθυνη για το πράσινο χρώμα των φύλλων.

ΟΦΕΛΗ: Αυξάνει τον ρυθμό φωτοσύνθεσης των φυτών • Περιέχει υψηλά επίπεδα βιοδραστικών μοριών (πολυσακχαριτών, πολυπεπτιδίων, πρωτεϊνών, φαινολικών ενώσεων, βιταμινών, φυσικών ορμονών) και θρεπτικών στοιχείων τα οποία ενισχύουν τον ρυθμό ανάπτυξης των φυτών βελτιώνοντας όλες τις παραμέτρους ανάπτυξης και απόδοσης • Προσδίδει έντονο σκούρο πράσινο χρώμα στο φύλλωμα των φυτών εμποδίζοντας τον σχηματισμό νεαρών χλωρωτικών φύλλων • Περιέχει οργανική ουσία που βελτιώνει την δομή του εδάφους • Χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοδιαθεσιμότητα και βαθμιαία απελευθέρωση ιχνοστοιχείων εξασφαλίζοντας στο μέγιστο τις απαιτήσεις της καλλιέργειας • Είναι φιλικό προς το περιβάλλον αφού δεν περιέχει χημικά συνθετικά μέσα και εξαιτίας της εξειδικευμένης σύνθεσής του εμποδίζει την απώλεια των θρεπτικών στοιχείων λόγω έκπλυσης • Είναι πλήρως αφομοιώσιμο με γρήγορη απορρόφηση από τα φυτά ενισχύοντας την ανάπτυξη υγιών φυτών με αυξημένη ανεκτικότητα σε ασθένειες, εχθρούς και αβιοτικές καταπονήσεις.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

Γενικά στην κηποτεχνία: Εφαρμογή κάθε 7-15 ημέρες με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας είτε με ριζοπότισμα μια φορά τον μήνα.

pH: 5.9 | EC: 177 μS/cm | Οργανική ουσία 27.6%



Ομάδα λιπασμάτων (στ) Υ.Α 257921/2004

Αριθμός Κυκλοφορίας 224



Σιτηρά, καλαμπόκι ελαιοκράμβη: 1-2 εφαρμογές. 1^η εφαρμογή στα 4-8 φύλλα και κατά την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους. Διαφυλλικά: 100-150 cc στα 100 λίτρα νερού.

Γενικά στα λαχανοκομικά: Πριν την μεταφύτευση, όταν υπάρχει επαρκής φυλλική επιφάνεια, 15 ημέρες μετά από την μεταφύτευση και καθ' όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου με μεσοδιάστημα 3-4 εβδομάδων μεταξύ των επεμβάσεων. Διαφυλλικά 100-150 cc στα 100 λίτρα νερού ή υδρολίπανση με 1 λίτ./στρ.

Φράουλα: 3-4 εφαρμογές μετά τη μεταφύτευση. Υδρολίπανση με 1 λίτ./στρ. ή 100-150cc/100 λίτρα διαφυλλικά. **Αμπέλι:** Προτείνονται 2-6 εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι τη συγκομιδή. Υδρολίπανση με 1-1.5 λίτ./στρ. ή 100-150cc/100 λίτρα διαφυλλικά.

Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, κερασιά): 3-5 εφαρμογές από την καρπόδεση ως το στάδιο μέγιστης αύξησης των καρπών. Υδρολίπανση με 1 λίτ./στρ. ή 150-200cc/100 λίτρα διαφυλλικά.

Μηλιά, Αχλαδιά, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Ακτινίδια: Προτείνονται 3-5 εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης έως το στάδιο μέγιστης αύξησης των καρπών. Υδρολίπανση με 1 λίτ./στρ. ή 150-200 cc/100 λίτρα διαφυλλικά. **Αμυγδαλιά κ.α.:** 2-4 εφαρμογές από την καρπόδεση και μετά. Υδρολίπανση με 1 λίτ./στρ. ή 100-200cc/100 λίτρα διαφυλλικά.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1.180g/L. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα προϊόντα θρέψης και φυτοπροστασίας. Πριν την χρήση συνιστάται η εφαρμογή σε μικρές επιφάνειες, ώστε να ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα προϊόντα.

Παρασκευαστής και διανομέας: Ikorganic, Ελαιών 36, 14564 Ν.Κηφισιά, Τηλ.: 210 8000551, info@ikorganic.com, www.ikorganic.com. Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777. Προϊόν σταθερής σύνθεσης. **ΔΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.** Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν. Κωδικός λιπασματοποίησης (407Y23E090C) (Ζ. ΥΠ.2.3)



1L