

# Tank

## 13-40-13 + TE

Υδατοδιαλυτό Λίπασμα

B: 0,015% • Cu: 0,01% • Fe: 0,04% • Mn: 0,065% • Mo: 0,002% • Zn: 0,07%

### Τι είναι το Tank 13-40-13;

ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ (CE ΚΛΠ 1(Γ) (I) (α) (ii))

Ο τύπος 13-40-13 της σειράς Tank είναι ένα υδατοδιαλυτό, κρυσταλλικό, πλήρες λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία σε χημική μορφή ιδανικό για τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των φυτών ως 'εκκινήτης' της καλλιέργειας.



### Σύνθεση

Ολικό Άζωτο (N) 13% • Άζωτο Νιτρικό (N-NO<sub>3</sub>) 3,6% • Άζωτο Αμμωνιακό (N-NH<sub>4</sub>) 7,9% • Άζωτο Ουρικό (N-NH<sub>2</sub>) 1,8% • Ολικό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 40% • Υδατοδιαλυτό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 40% • Οξείδιο του Καλίου Υδατοδιαλυτό (K<sub>2</sub>O) 13% • Ολικό Βόριο (B) 0,015% • Ολικός Χαλκός (Cu) 0,01% • Ολικός Σίδηρος (Fe) 0,04% • Ολικό Μαγγάνιο (Mn) 0,065% • Ολικό Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002% • Ολικός Ψευδάργυρος (Zn) 0,07%



## Τρόπος εφαρμογής & Δοσολογίες

Γενικά εφαρμόζεται στις ακόλουθες δοσολογίες:

Υδρολίπανση: 2,5-5 kg/στρ.

Διαφυλλικά: 1-3 kg/1000 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος

### Γιατί επιλέγουμε το Tank 13-40-13;

- Περιέχει πλήρως υδατοδιαλυτό αφομοιώσιμο φώσφορο.
- Είμαι ιδανικό για τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των φυτών, ως «εκκινητής» της καλλιέργειας.
- Συμβάλει στην ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος.
- Είναι κατάλληλο για εδάφη με υψηλό pH.
- Προάγει την ανθοφορία, εξασφαλίζει την πρωιμότητα και ομοιομορφία της άνθησης, αποτρέπει την ανθόρροια.
- Διασφαλίζει ένα δυνατό ξεκίνημα της καλλιέργειας.
- Επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις.

### Περίοδος εφαρμογών

Καλλιέργεια	Χρόνος Εφαρμογής	Επαναλήψεις
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	Κατά την μεταφύτευση και με την εμφάνιση κάθε νέας ταξιανθίας	
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Αγγούρι	Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης φύλλων και βλαστών. Κατά το άνοιγμα των ανθοφόρων οφθαλμών, το δέσιμο και γέμισμα των καρπών.	3 εφαρμογές
Φυλλώδη Λαχανικά (Μαρούλι, Σπανάκι)	2 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση	
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο	Κατά τη μεταφύτευση και κατά τη βλαστική ανάπτυξη	2 εφαρμογές
Πατάτα	Κατά τα πρώτα στάδια βλαστικής ανάπτυξης και κατά τον σχηματισμό των κονδύλων	
Βολβώδη λαχανικά (Κρεμμύδι, Σκόρδο)	Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φύλλων	1 εφαρμογή
Ριζώδη λαχανικά (Καρότο, Σέλινο, Παντζάρι)	Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φύλλων	2 εφαρμογές
Ψυχανθή (Φασόλια, Μπιζέλια)	Κατά την ανάπτυξη των φύλλων και βλαστών και με την εμφάνιση των ανθέων	2 εφαρμογές
Φράουλα	Κατά το σχηματισμό της ροζέτας, την ανάπτυξη των φύλλων και πριν την άνθηση	2-3 εφαρμογές
Καλαμπόκι	Κατά το στάδιο των 3-4 φύλλων	
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά)	Από το στάδιο της ρόδινης κορυφής ως την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών	2-3 εφαρμογές ανά 10-15 ημέρες
Γιγαρτόκαρπα (Μηλιά, Αχλαδιά)	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής ως την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών	2-3 εφαρμογές ανά 10-15 ημέρες
Ελιά, Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Αμπέλι	Κατά την άνθηση και την καρπόδεση	
Φυτώρια	Νεορά φυτάρια ή δενδρύλλια με έντονη ανάπτυξη	