

Tank

15-5-30 + TE

Υδατοδιαλυτό Λίπασμα

B: 0,015% • Cu: 0,01% • Fe: 0,04% • Mn: 0,065% • Mo: 0,002% • Zn: 0,07%

Τι είναι το Tank 15-5-30;

ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ (CE ΚΛΠ 1(Γ) (I) (a) (ii))

Ο τύπος 15-5-30 της σειράς Tank είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα υψηλής απόδοσης που παρέχει αποτελεσματική, γρήγορη και πλούσια θρέψη στα φυτά.



Σύνθεση

Ολικό Άζωτο (N) 15% • Άζωτο Νιτρικό (N-NO₃) 8,8% • Άζωτο Αμμωνιακό (N-NH₄) 5,3% • Άζωτο Ουρικό (N-NH₂) 0,9% • Ολικό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P₂O₅) 5% • Υδατοδιαλυτό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P₂O₅) 5% • Οξείδιο του Καλίου Υδατοδιαλυτό (K₂O) 30% • Ολικό Βόριο (B) 0,015% • Ολικός Χαλκός (Cu) 0,01% • Ολικός Σίδηρος (Fe) 0,04% • Ολικό Μαγγάνιο (Mn) 0,065% • Ολικό Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002% • Ολικός Ψευδάργυρος (Zn) 0,07%



Τρόπος εφαρμογής & Δοσολογίες

Γενικά εφαρμόζεται στις ακόλουθες δοσολογίες:

Υδρολίπανση: 2,5-5 kg/στρ.

Διαφυλλικά: 1-3 kg/1000 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος

Γιατί επιλέγουμε το Tank 15-5-30;

- Είναι ενισχυμένο με μείγμα ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή.
- Ευνοεί το σχηματισμό της χλωροφύλλης, εξασφαλίζει υψηλή και ποιοτική παραγωγή.
- Χαρακτηρίζεται από χαμηλό pH και χαμηλή EC.
- Καθιστά τα θρεπτικά στοιχεία άμεσα απορροφήσιμα από τα φυτά.
- Αναπτύσσει υγιή και ανθεκτικά φυτά σε αβιοτικές καταπονήσεις και ασθένειες.
- Αναβαθμίζει την ποιότητα παραγωγής.
- Επιτυγχάνει βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων καρπών.
- Ευνοεί την καρπόδεση και το γέμισμα του καρπού.

Περίοδος εφαρμογών

Καλλιέργεια	Χρόνος Εφαρμογής	Επαναλήψεις
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	Στην 1 ^η ανάπτυξη και 1 ^ο δέσιμο καρπών	5-7 ανά 15 ημέρες
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Αγγούρι	Στην 1 ^η ανάπτυξη μέχρι το δέσιμο και στην ανάπτυξη των καρπών	Ανά 15 ημέρες
Φυλλώδη Λαχανικά (Λάχανο, Μπρόκολο, Μαρούλι, Σπανάκι)	20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση	Ανά 15 ημέρες
Φασόλια, Μπάμιες	1 ^η εφαρμογή στα 4-5 φύλλα και σε όλη την ανάπτυξη	Ανά 10-15 ημέρες
Πατάτα	Στα νεαρά φυτά μέχρι πριν τον σχηματισμό κονδύλων	Ανά 10-15 ημέρες
Πράσο, Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Παντζάρια και άλλα βολβώδη	Στα νεαρά στάδια	1-2 ανά 10-15 ημέρες
Φράουλα	Με την εμφάνιση του πρώτου ανθοφόρου οφθαλμού	3 ανά 7-10 ημέρες
Βαμβάκι	1 ^η εφαρμογή στα 6 φύλλα μέχρι την έναρξη ωρίμανσης των καρυδιών	
Ζαχαρότευτλα	Στα 10 - 12 φύλλα και στην ανάπτυξη ρίζας	Ανά 10-15 ημέρες
Ηλιανθος	Πριν την άνθηση στο γέμισμα του σπόρου	
Καλαμπόκι	Στα νεαρά στάδια ανάπτυξης μαζί με τα ζιζανιοκτόνα	
Μηδική	Μετά από κάθε κοπή	
Καπνός	Από τα νεαρά στάδια ανάπτυξης και σε όλη τη περίοδο βλαστικής ανάπτυξης	
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Ρύζι	Στην έναρξη του αδελφώματος μαζί με τα ζιζανιοκτόνα. 2 ^η εφαρμογή μόλις αρχίσουν να εμφανίζονται τα στάχυα	
Αμπέλι	1 ^η εφαρμογή πριν την άνθηση. 2 επαναλήψεις μετά το δέσιμο της ράγας	
Εσπεριδοειδή	Στην έναρξη της νέας βλαστικής ανάπτυξης την άνοιξη πριν την άνθηση και μετά το δέσιμο των καρπών	
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φισικιά, Καρυδιά)	Μετά το δέσιμο των καρπών	2-3 φορές ανά 15 ημέρες
Ελιά	Κατά το κρόκισμα, επανάληψη μετά το δέσιμο	
Καλλωπιστικά, Φυτόρια	Ανθοφόρα φυτά: από τα νεαρά στάδια ανάπτυξης μέχρι την ανθοφορία. Φυτόρια καλλωπιστικών θάμνων, φυτών και φυτών εσωτερικού χώρου: από την άνοιξη μέχρι τον Ιούνιο και επαναλαμβάνονται οι εφαρμογές Σεπτέμβριο με Οκτώβριο.	Ανά 10-15 ημέρες