

Tank

20-20-20 + TE

Υδατοδιαλυτό Λίπασμα

Περιέχει 1% μείγμα αμινοξέων προερχόμενα από υπόστρωμα καλλιέργειας μανιταριών των οικογενειών (*Pleurotaceae, Agaricaceae, Polyporaceae*)

Τι είναι το Tank 20-20-20;

ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ (CE ΚΛΠ 1(Γ) (I) (a) (ii))

Ο τύπος 20-20-20 της σειράς Tank είναι ένα υδατοδιαλυτό, κρυσταλλικό, ισόρροπο πλήρες λίπασμα, πλούσιο σε κύρια θρεπτικά στοιχεία (N-P-K) με ικνοστοιχεία σε χηλική μορφή. Αποτελεί τον πλέον δημοφιλή τύπο λιπάσματος και είναι προϊόν θρέψης πολλαπλών χρήσεων.



Σύνθεση

Ολικό Άζωτο (N) 20% • Άζωτο Νιτρικό (N-NO₃) 5,8% • Άζωτο Αμμωνιακό (N-NH₄) 3,9% • Άζωτο Ουρικό (N-NH₂) 10,3% • Ολικό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P₂O₅) 20% • Υδατοδιαλυτό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P₂O₅) 20% • Οξείδιο του Καλίου Υδατοδιαλυτό (K₂O) 20% • Ολικό Βόριο (B) 0,015% • Ολικός Χαλκός (Cu) 0,01% • Ολικός Σίδηρος (Fe) 0,04% • Ολικό Μαγγάνιο (Mn) 0,065% • Ολικό Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002% • Ολικός Ψευδάργυρος (Zn) 0,07% • pH 4,6



Τρόπος εφαρμογής & Δοσολογίες

Γενικά εφαρμόζεται στις ακόλουθες δοσολογίες:

Υδρολίπανση: 2,5-5 kg/στρ.

Διαφυλλικά: 1-3 kg/1000 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος

Γιατί επιλέγουμε το Tank 20-20-20;

- Είναι πλούσιο σε κύρια θρεπτικά στοιχεία (N-P-K), εμπλουτισμένο με μείγμα ικνστοιχείων σε χημική μορφή άμεσα αφομοιώσιμο από τα φυτά.
- Διασφαλίζει την ταχεία και προσοδευτική αφομοίωση των θρεπτικών από τα φυτά.
- Χαρακτηρίζεται από απουσία χλωρίου, χαμηλά επίπεδα διουρίας και χαμηλό pH.
- Παρέχει ισορροπημένη θρέψη.
- Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
- Εξασφαλίζει υγιή και επαρκή ανάπτυξη των καλλιεργειών.
- Επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή.
- Βελτιώνει την ανάπτυξη ριζών και βλαστών και τον σχηματισμό υψηλής ποιότητας ανθοφόρων οφθαλμών και καρπών.

Περίοδος εφαρμογών

Καλλιέργεια	Χρόνος Εφαρμογής	Επαναλήψεις
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Αγγούρι	Όταν τα φυτά είναι 3-4 εβδομάδων	Ανά 7-10 ημέρες
Φυλλώδη Λαχανικά (Αντίδια, Ραδικία, Μαρούλι, Σπανάκι, Λάχανα, Κουνουπίδια, Μπρόκολα)	20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση	Ανά 10 ημέρες
Αγκινάρα	Από τα 5-6 φύλλα έως την έναρξη σχηματισμού άνθους	2-3 εφαρμογές
Πατάτα	Σε νεαρά φυτά και κατά τον σχηματισμό των κονδύλων	Ανά 10-15 ημέρες
Φράουλα	Από την βλαστική ανάπτυξη μέχρι το δέσιμο και γέμισμα των καρπών	
Βαμβάκι	Κατά την ανθοφορία	1-5 εφαρμογές
Καλαμπόκι		1-5 εφαρμογές
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Ρύζι	Κατά το αδελφωμα και το καλάμωμα	
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Ακρόδρυσ (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά)	Από το τέλος της ανθοφορίας (πτώση των πετάλων) μέχρι το γέμισμα των καρπών	
Εσπεριδοειδή	Κατά την έναρξη της βλάστησης, την άνοιξη και μετά την συγκομιδή.	
Αμπέλι	Κατά την βλαστική ανάπτυξη και στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της ράγας	
Ακτινίδιο	Από την έναρξη της βλάστησης μέχρι τη ανθοφορία, την καρπόδεση και την ανάπτυξη των καρπών	
Καπνός	Στα νεαρά φυτά και κατά την μεταφύτευση	
Χλοστάπτας	Έναρξη εφαρμογών τον Μάρτιο	Κάθε μήνα
Καλλωπιστικά φυτά	3 gr/lit νερού	Ανά 15 ημέρες